



Campo Largo, 14 de março de 2022.

A Banca Examinadora divulga o gabarito oficial das especialidades médicas que realizaram a segunda fase do terceiro processo seletivo 2022.

GABARITO CAPACITAÇÃO EM CIRURGIA GERAL –

- 1- Oxigênio sob máscara, Beta-2 agonista por via inalatória, primeira dose do corticoide, primeira dose do antibiótico, encaminhar urgentemente ao hospital
- 2- Realizar o acolhimento/escuta da criança, tratar lesões e dor, se indicado, realizar a notificação, mediante o preenchimento da ficha do MS; comunicar ao Conselho Tutelar e/ou à autoridade competente; definir projeto terapêutico singular, com equipe multidisciplinar e acompanhamento psicológico.
- 3- Linfogranuloma venereo e *Chlamydia trachomatis*
- 4- Realizar colposcopia e biópsia dirigida
- 5- Perfuração, bacteremia, distensão abdominal, colite química, pneumoperitonio.
- 6- Medidas higiene dietéticas, restrição ao uso do papel higiênico, banho de assento com água morna, laxativos, pomadas e supositórios compostos por anestésicos e anti-inflamatórios, administração de drogas vasoativas-diosmina.
- 7- Placenta prévia e ultrassonografia transvaginal
- 8- Síndrome HELLP, hemograma, enzimas hepáticas e plaquetas
- 9- Endometriose
- 10- Perfuração uterina, internamento, coleta de exames laboratoriais, ecografia abdominal e plano cirúrgico na confirmação da lesão.



GABARITO CIRURGIA TORÁCICA

1-FC entre 100 e 120 bpm, PA normal, FR entre 20 e 30 e perda volêmica entre 750 e 1500ml.

2-Reposição volêmica com cristalóide e tipagem sanguínea.

3-Trata-se de uma neoplasia cística benigna do pâncreas com baixo índice de malignização e cujo tratamento deve ser conservador e com exames seriados.

4-Neste caso, o paciente flutua nível de consciência, a ausculta pulmonar exibe estertores difusos e existe a ausência de pulso periférico palpável.

5-No T2a o tumor é maior que 3 centímetros porem é menor que 5 centímetros

GABARITO GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA –

1. Oxigênio sob máscara, Beta-2 agonista por via inalatória, primeira dose do corticoide, primeira dose do antibiótico, encaminhar urgentemente ao hospital

2. Realizar o acolhimento/escuta da criança, tratar lesões e dor, se indicado, realizar a notificação, mediante o preenchimento da ficha do MS; comunicar ao Conselho Tutelar e/ou à autoridade competente; definir projeto terapêutico singular, com equipe multidisciplinar e acompanhamento psicológico.

3. Linfogranuloma venereo e *Chlamydia trachomatis*

4. Realizar colposcopia e biópsia dirigida

5. Perfuração, bacteremia, distensão abdominal, colite química, pneumoperitônio.

6. Medidas higiene dietéticas, restrição ao uso do papel higiênico,



banho de assento com água morna, laxativos, pomadas e supositórios compostos por anestésicos e anti-inflamatórios, administração de drogas vasoativas-diosmina.

7. Placenta prévia e ultrassonografia transvaginal

8. Síndrome HELLP, hemograma, enzimas hepáticas e plaquetas

9. Endometriose

10. Perfuração uterina, internamento, coleta de exames laboratoriais, ecografia abdominal e plano cirúrgico na confirmação da lesão.

GABARITO NEUROCIRURGIA

1.1.- A pupila de Argyll Robertson é caracterizada por uma pupila que não responde a exposição a luz, entretanto se contrai quando foca em um objeto próximo ocorre uma brusca constrição.

1.2. Patologia: sífilis.

2.1. O paciente apresenta uma paralisia evidente, porém não desfigurante, é capaz de fechar o olho, porém com grande esforço. O desvio da rima labial é evidente e muitas vezes acompanhado de espasmos.

2.2. Paralisia de Bell

Excluir neurinoma do acústico

2.3. Corticosteróides, antivirais, colírio, pomada oftálmica e tampão noturno, fisioterapia.

2.4. Audiometria e Ressonância magnética

3 – Sim, existe a necessidade do preenchimento da DO em todas as situações que configuram natimorto, pautado no tempo gestacional, no peso e no comprimento do feto.



4.1. Descolamento prematuro de placenta.

4.2. Manutenção do estado volêmico, transfusão sanguínea, monitorização da condição materna e avaliação da condição fetal.

5.1. Déficit de membros superiores mais acentuada que em membros inferiores.

5.2. ASIA é uma abreviatura do American Spinal Injury Association, e o tipo C indica a existência de presença de atividade motora voluntária, mas com força motora menor que 3.

6.1. Lesão axonal difusa

6.2. A curva que relaciona volume intracraniano em expansão e pressão intracraniana, sendo que a deterioração neurológica ocorre quando existe inflexão abrupta da curva, tendo os mecanismos fisiopatológicos de complacência exauridos.

7.1. Isquemia mesentérica aguda

7.2. Angiografia mesentérica ou angiotomografia abdominal.

7.3. Laparotomia exploradora

8.1. Baixa idade gestacional, baixo peso ao nascer, menor que 1000gramas, sexo masculino, intubação orotraqueal e síndrome do desconforto respiratório.

8.2. O corpo caloso é uma estrutura composta por fibras nervosas e cuja função é a conexão de ambos os hemisférios.

A agenesia do corpo caloso é a sua ausência parcial ou completa, podendo muitas vezes ser assintomática, assim como determinar atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, epilepsia e paralisia cerebral.

8.3. É uma anomalia da clivagem do lobo frontal, no qual este não realiza a sua divisão, tendo a fusão do corno anterior dos ventrículos e ausência do septo pelúcido e disgenesias do corpo caloso e da face.



8.4. Indometacina e acetazolamida.

9.1. Esclerose múltipla

9.2. Critérios de McDonald

9.3. Deficiência de vitamina B12, neuro sífilis e HIV

9.4. B- Interferon, Glatirâmer, Teriflonomida

10.1. Acidente vascular encefálico isquêmico

10.2. Significa que tem 5 áreas cerebrais acometidas na classificação de Aspects.

10.3. Hematoma subdural

10.4. Significa que houve transformação hemorrágica com petéquias de forma confluyente

GABARITO ORTOPEDIA

1- Oxigênio sob máscara, Beta-2 agonista por via inalatória, primeira dose do corticoide, primeira dose do antibiótico, encaminhar urgentemente ao hospital

2- Realizar o acolhimento/escuta da criança, tratar lesões e dor, se indicado, realizar a notificação, mediante o preenchimento da ficha do MS; comunicar ao Conselho Tutelar e/ou à autoridade competente; definir projeto terapêutico singular, com equipe multidisciplinar e acompanhamento psicológico.

3- Linfogranuloma venereo e Chlamydia trachomatis

4- Realizar colposcopia e biópsia dirigida

5- Perfuração, bacteremia, distensão abdominal, colite química, pneumoperitônio.

6- Medidas higiene dietéticas, restrição ao uso do papel higiênico, banho de assento com água morna, laxativos, pomadas e supositórios compostos por anestésicos e anti-inflamatórios,



administração de drogas vasoativas-diosmina.

7- Fratura de Colles. Tratamento conservador.

8- T7 e Ressonância Magnética de Coluna

9- Supra espinhal, infra espinhal, subescapular e redondo menor.

10- Cruzado anterior, cruzado posterior, colateral medial e colateral lateral. Ressonância Magnética do joelho

GABARITO RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM –

1-Oxigênio sob máscara, Beta-2 agonista por via inalatória, primeira dose do corticoide, primeira dose do antibiótico, encaminhar urgentemente ao hospital

2-Realizar o acolhimento/escuta da criança, tratar lesões e dor, se indicado, realizar a notificação, mediante o preenchimento da ficha do MS; comunicar ao Conselho Tutelar e/ou à autoridade competente; definir projeto terapêutico singular, com equipe multidisciplinar e acompanhamento psicológico.

3-Linfogranuloma venéreo e *Chlamydia trachomatis*

4-Realizar colposcopia e biópsia dirigida

5-Perfuração, bacteremia, distensão abdominal, colite química, pneumoperitônio.

6-Medidas higiene dietéticas, restrição ao uso do papel higiênico, banho de assento com água morna, laxativos, pomadas e supositórios compostos por anestésicos e anti-inflamatórios, administração de drogas vasoativas-diosmina.

7-Fratura de Colles. Tratamento conservador.

8- Hidrocele. Ultrassonografia.

9- Supra espinhal, infra espinhal, subescapular e redondo menor.



10. Hematoma subdural. Lesão Axonal Difusa.